

農薬	病害虫										使用回数	使用時期
	灰色カビ病	菌核病	斑点病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類	タバコガ類	ヨトウムシ類	ハダニ類	ホコリダニ類		
オリゼート粒剤			○								1回	定植時
アクタラ粒剤5					○						1回	定植時
ジーファイン水和剤				○							回数制限なし	収穫前日まで
チェス顆粒水和剤					○						3回以内	収穫前日まで
ロブラール水和剤	○	○									4回以内	収穫前日まで
マッチ乳剤							○	○			4回以内	収穫前日まで
アーデント水和剤					○	○		○	○		2回以内	収穫前日まで
アミスターオブティフロアブル	○		○	○							3回以内	収穫前日まで
ウララDF					○						2回以内	収穫前日まで
コテツフロアブル						○	○	○	○	○	2回以内	収穫前日まで
ハチハチ乳剤				○	○					○	1回	収穫前日まで
ダコニール1000	○		○	○							3回以内	収穫前日まで
ディアナSC						○	○	○			2回以内	収穫前日まで
ストロビーフロアブル	○	○	○	○							3回以内	収穫前日まで
ブレオフロアブル						○	○	○			2回以内	収穫前日まで
フェニックス顆粒水和剤							○	○			2回以内	収穫前日まで
モスピラン顆粒水溶剤					○	○					2回以内	収穫前日まで

農薬使用上の注意 ※必ず農薬容器のラベルなどを確認し使用基準を守りましょう（作物名、倍率、使用時期、使用回数等）

※マスクや保護メガネ、防除衣を着用し散布者の健康を守りましょう。

※周辺への飛散や水への流入がないよう注意し環境を守りましょう。

※専用の保管庫などを用意、管理し事故を防止しましょう。

※散布後は器具を洗浄し農薬散布の記録を残しましょう。